

způsoben virem
herpes simplex

konečné
stádium
viru HIV

přenos běžným
pohlavním
stykem, při
kontaktu úst či
konečníku

přenos
nechráněným
pohlavním
stykem

nejrozšířenější
onemocnění

genitální
bradavice

onemocnění
přenosné
pohlavním
stykem

styk bez
použití
ochrany

bez
výraznějších
příznaků

puchýřky a
bolestivé
vřidky

zanedbání
léčby
ovlivňuje
zdraví

onemocnění
lze předejít
vhodnou
prevencí

parazitické
onemocnění

hnisavý
zánět
močového a
pohlavního
ústrojí

přenos krevní
cestou
(infuze, aplikace
drog)

může
způsobit
neplodnost

časté střídání
sexuálních
partnerů

zanedbání
léčby
způsobuje
poškození
orgánů

léčba
antivirotiky

přenos z
infikované
matky na
dítě

přítomnost
syfilitické
vyrážky

vztah s
rizikovým
partnerem

těhotenství
nemocných
žen ukončeno
často
potratem

náchylnost
k pohlavně
přenosným
chorobám

proniká do
různých
orgánů těla

infekční
zánět jater

léčba
antibiotiky

typ B

v místě
vstupu
infekce se
objeví vřed

pálení,
svědění a
zarudnutí
sliznice

nevyléčitelné
onemocnění

"syndrom
získaného
selhání
imunity"

dělí se na
bakteriální,
virové,
parazitické a
plísňové

zjišťuje se
štěrém ze
sliznice

inkubační
doba až 120
dní

prvotní
příznak je
horečka,
nevolnost a
únava

svědění a
bolest v
oblasti
pohlavního
ústrojí

první stádium
často
připomíná
chřipku

mnohem
častější než
syfilis

promiskuita