

způsoben virem
herpes simplex

konečné
stádium
viru HIV

přenos běžným
pohlavním
stykem, při
kontaktu úst či
konečníku

přenos
nechráněným
pohlavním
stykem.

nejrozšířenější
onemocnění

genitální
bradavice

onemocnění
přenosné
pohlavním
stykem

styk bez
použití
ochrany

bez
výraznějších
příznaků

puchýřky a
bolestivé
vřídky

zanedbání
léčby
ovlivňuje
zdraví

onemocnění
lze předejít
vhodnou
prevencí

parazitické
onemocnění

hnisavý
zánět
močového a
pohlavního
ústrojí

přenos krevní
cestou
(infuze, aplikace
drog)

může způsobit neplodnost

časté střídání sexuálních partnerů

zanedbání léčby způsobuje poškození orgánů

léčba antivirotyky

přenos z infikované matky na dítě

přítomnost syfilitické výrázky

vztah s rizikovým partnerem

těhotenství nemocných žen ukončeno často potratem

náchylnost k pohlavně přenosným chorobám

proniká do různých orgánů těla

infekční zánět jater

léčba antibiotiky

typ B

v místě vstupu infekce se objeví vřed

pálení, svědění a zarudnutí sliznice

nevyléčitelné
onemocnění

"syndrom
získaného
selhání
imunity"

dělí se na
bakteriální,
virové,
parazitické a
plísňové

zjišťuje se
štěrem ze
sliznice

inkubační
doba až 120
dní

prvotní
příznak je
horečka,
nevolnost a
únavá

svědění a
bolest v
oblasti
pohlavního
ústrojí

první stádium
často
připomíná
chřipku

mnohem
častější než
syfilis

promiskuita

